Colloque France Traumatisme Crânien 2018

« Application de technologies innovantes dans les états de conscience altérée »

Place des robots de rééducation dans le parcours de soins des patients avec troubles de la conscience

Dr Bénédicte Pontier

Service de Neurochirurgie, CHU Clermont-Ferrand

Institut Pascal, UMR 6602 UCA/CNRS/SIGMA

Centre de MPR de Pionsat

Parcours de soins des ECM / EVC

SRPR

services de rééducation post-réanimation
circulaire 2004
Cahier des charges IDF 2013

Unités de soins de proximité dédiées aux personnes ECM-ENR
Circulaire 3 mai 2002

SSR
services de rééducation neurologique

Domicile

Après un séjour en réanimation, la prise en charge rééducative précoce lors de toute maladie grave

- Durée hospitalisation
- handicap fonctionnel
- Coût moyen de la maladie

Gruther, 2017, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation

TCC : Programme de Rééducation précoce et prolongée pendant 12 mois / autre groupe sans rééducation précoce

➤ GOSE : 70% bons résultats Précoce vs 37% non précoce

Andelic N, J. Neurotrauma, 2012

SRPR en 2018 – France

- CHU St Etienne (2003)
- CHU Lyon
- CHU Nancy
- (CHU Grenoble)

- Depuis février 2018 : 48 lits identifiés en Ile de France pour les patients « neurologiques »
 - ~ Hôpital Raymond Poincaré (Garches)
 - ~ Hôpital St Anne
 - ~ Hôpital Militaire de Percy
 - ~ Hôpital Bicêtre
 - ~ Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l'Oise

- « Unités d'éveil » : cahiers des charges variables ...

EN EUROPE :

Rééducation en phase aigue après cérébrolésion

- 72 centres en Europe
 - CS médecin MPR : 70% des cas,
 - prise en charge par équipe pluridisciplinaire : 40%
- Pas de différence entre pays à faible ou haut revenu/habitant
- Stimulation motrice et sensorielle puis pharmacologique
- Influence de l'âge pour diriger les patients dans 46% des cas : jeunes > Agées
- Durée d'attente de transfert en soins intensifs-courts séjours et SSR < 1 mois.

Cnossen M. 2017, j. rehabil. med.

Pourquoi des robots de rééducation en phase précoce ?

- Mobilisation passive précoce, Rééducation répétitive
- Spécifique d'une tâche motrice : pédalage, marche...
- Entraînement normalisé
- Augmentation progressive de l'intensité de l'entraînement
- Gain de temps pour le thérapeute
- Enregistrement

Boston
Dynamics

Cycloergomètre de
membres supérieurs et
inférieurs

Erigo pro - Hocoma

- Adaptation position verticale , amélioration de la fonction vestibulaire et sensorimotrice après AVC (*Calabro 2015*)
- Bonne tolérance, pas d'augmentation de la production de catécholamines (*Rocca A*)
- Verticalisation bénéfique en phase subaiguë et bien toléré pour les ECM, EVC : + 2 points de la CRS-R (*Krewer C*)
- Meilleure tolérance à l'orthostatisme de l'inclinaison avec système de marche intégrée (*Luther M. 2008, Kutznetsov 2013, Frazitta G*)
- Réduction complications précoces après AVC (*Diserens K, 2011, Clinical rehabilitation*)

Entraînement à la marche assistée par un robot pour les AVC « en aigu »

- Intensité d'entraînement à la marche > kiné simple chez les patients **AVC non marchants** (Hesse S, J Rehabil Res Dev, 2012).
- **En phase aiguë ou subaiguë** : entraînement avec soutien du corps par harnais : ↗ vitesse, fonctionnalité marche, et mobilité vs kiné simple (Cho JE, Biomed Res Int, 2018)
- ↘ progressive de l'assistance du robot vs assistante totale serait plus favorable pour augmenter les capacités de marche (Park IJ, Am J Phys. Med Rehabil, 2018).

Lokomat Pro

IRM fonctionnelle lors de mouvements du MS parétique

- **Après AVC, lors de mouvements du MS parétique vs sujets sains**

(Méta-analyse de 20 expériences IRMf, Rehme AK, Neuroimage, 2012)

Augmentation des activations dans les zones motrices contralésionnelles (M1) et de manière bilatérale : cortex prémoteur ventral et SMA . Meilleure récupération fonctionnelle si recrutement du M1 ipsilésionnel, le cortex prémoteur et cervelet en contralésionnel

IRM fonctionnelle avant et après rééducation assistée par un robot de MS

- **Resting state (connectivité fonctionnelle de repos)** avant et après rééducation robotisée vs imagerie motrice : gain de force et modification RS-fMRI ↗ : avec imagerie motrice > robot (*Varkuti, 2013, Neurorehabil Neural Repair*)
- **Robot sur main parétique** : AVANT activation M1 contralésionnel, APRES amélioration de la force avec « normalisation » des activations en M1 et SMA ipsilésionnel (*Pinter D, top stroke rehabil, 2013*)
- **Robot bilatéral de MS** : Changement plus prononcé de manière bilatérale des activations dans les 2 cortex M1 et SMA, pour le groupe robot vs rééducation traditionnelle : amélioration des connexions interhémisphériques ? (*Etude sur 6 patients post-AVC en aigu, Fan YT, neurocase, 2016*).

Merci à